

學校常見傳染病

校園常見傳染病防疫措施

疾病名稱	疾病分類	病原	傳染途徑	環境消毒方法	請假建議	返校條件
流感	非法定傳染病 (流感併發重症為第四類傳染病)	流感病毒	飛沫、接觸	75%酒精、漂白水	建議在家休息 5 日	確實服用完抗病毒藥物療程(5 日)待病情穩定後始可返校上課，如 5 日內實有到校之需求，須退燒至少滿 24 小時才能返回上課，並配合配戴口罩直至相關症狀(咳嗽、肌肉酸痛、流鼻水、喉嚨痛)解除滿 24 小時為止，落實生病不上班、不上課。
腸病毒 (手足口病、疱疹性咽峽炎)	非法定傳染病 (腸病毒感染併發重症為第三類傳染病)	腸病毒 ABCD 型	飛沫、接觸、糞口	漂白水	建議在家休息 7 日	返校前再次就診請醫師判斷手足或口腔內是否仍有小水泡或潰瘍等情形是否適合返校上課。
水痘	非法定傳染病 (水痘併發症為第四類傳染病)	帶狀疱疹病毒	接觸、飛沫、空氣	漂白水	皮疹一出現後至少應停止上課 7 日	所有水疱需乾燥結痂，故應至少停止上課 7 日，返校前再次就診請醫師判斷是否適合返校，或到校時暫不入班先至健康中心讓護理師確認是否所有水疱已經乾燥結痂。
病毒性腸胃炎 (諾羅)	非法定傳染病	諾羅、輪狀病毒等	飛沫、接觸、糞口	漂白水	建議在家休息 3 日	依醫師指示接受治療，在家休息至症狀解除至少 48 小時，再恢復上學或工作。
流行性腮腺炎	第三類傳染病	副黏液病毒屬之流行腮腺炎	飛沫、接觸	漂白水	建議在家休息 5 日	自腮腺開始腫大隔離 5 日，應戴口罩進行呼吸道隔離。